



ORGANIC PLUS SP
BIOLOŠKI DODATAK TLU

**IZUZETNO DJELOTVORAN
PRIRODNI BIO-STIMULANT
ZA BILJKE I MIKROBNI
UNAPRIJEĐIVAČ ZA TLO
SA BIO-FUNGICIDNIM
SVOJSTVIMA**

Sadrži visoku koncentraciju humusnih i fulvisnih kiselina, rhamnolipida, morskih biljaka, enzima i mikro-nutrijenta.

ORGANIC PLUS SP:

- Pospješuje prinos usjeva;
- Pospješuje stvaranje korjena;
- Povećava nicanje sjemena;
- Pospješuje plodnost tla;
- Povećava mikrobne aktivnosti;
- Pospješuje unos nutrijenta kod biljaka;
- Smanjuje bolesti;
- Obustavlja otrovne kemikalije;
- Koloidnost gnojiva.

ANALIZA TESTIRANJA



Tekući ORGANIC PLUS razrijeđen 1,000 puta je primijenjen na pepelnice lišća jagodnih biljki. Biljke su ispitane sedmog dana.

Rosa na vrhovima listova pokazuje učinkoviti metabolizam. Prinos jagoda je premašio sva očekivanja.



ODOBRENO

ZA UPORABU U BIOLOŠKOJ POLJOPRIVREDI OD STRANE QUEBECVRAI - OVLAŠTENE AGENCIJE ZA CERTIFICIRANJE ORGANSKIH PROIZVODA U KANADI.

SVOJSTVA

Opis	Tekućina
Pakiranje	20L, 205L i 1000L
Stabilnost	Maksimalan gubitak od 1 log/godinu
pH	4.5
Hranjivi sadržaj	Biološki hranjive tvari i stimulant
Skladištenje	Vidi sigurnosno-tehnički list

ZAJAMČENA MINIMALNA ANALIZA

Nitrogen (N)	1.00%
Fosfor (P205)	0.10%
Kalij (K2O)	1.00%
Kalcij (Ca)	3.00%
Magnezij (Mg)	0.50%
Sumpor (S)	2.30%
Željezo (Fe)	0.75%
Boron (B)	0.02%

ORGANIC PLUS SP

BIOLOŠKI
DODATAK TLU

NAČIN PRIMJENE

Razrijedite ORGANIC PLUS SP kako biste dobili koncentraciju od 85-100 ppm.

Uputstvo za miješanje – Napunite spremnik do pola sa vodom te nakon toga dodajte ORGANIC PLUS SP i protresite. Nastavite dodavati ostatak vode. Kada je sva voda dodana, temeljito protresite mješavinu prije uporabe.

ORGANIC SP PLUS se može pomiješati s drugim proizvodima kao što su nutrijenti i pesticidi ali je potrebno zadržati koncentraciju od 85-100 ppm. Otopinu bi trebalo iskoristiti u roku od 24 sata. Nakon 24 sata otopina može izgubiti učinkovitost.

Uputstvo za primjenu – Nanesite ORGANIC PLUS SP korištenjem uobičajene opreme za prskanje, maglu ili kvašenje do točke zasićenja. Uporaba spreja ili magle primjenjuje se po stopi od najmanje 378 litara po hektaru. Za natapanja ili uporabe za korijen, broj litara po hektaru treba povisiti ovisno o gustoći biljaka i zemljišnim uvjetima. Razmjer treba povećati po stopi od najmanje 567 litara po hektaru za zrele biljke.

ORGANIC SP PLUS se može dodati i u hranjive otopine za hidroponske biljke i povrće kao otopina za natapanje sjemena. Za postizanje početne kontrole proizvod treba primjeniti u ranim fazama biljnog rasta te u intervalima od 5 dana za vrijeme rasta u preventivne svrhe. Rani tretman sprječava razvoj bolesti.

ORGANIC PLUS SP je kontakt proizvod koji kontrolira nastanak bolesti pri kontaktu s zoosporama. Temeljna pokrivenost je potrebna za kontrolu bolesti. Kako bi se osigurala kontrola, proizvod je potrebno primjeniti u vrijeme kada postoje najbolji uvjeti za pojavu zoospora i ishod bolesti.

Čuvati izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. Koristite filtere kako biste spriječili začeppljivanje mlaznica. Provjerite kompatibilnost s gnojivima prije velikih uporaba.

Za više informacija o primjeni obratite se vašem BIONETIX tehničkom predstavniku.